

Le matériel

seringues, stylos



BECTON DICKINSON		B/BRAUN	OWEN MUMFORD	NOVO NORDISK		LILLY
						
1,5 ml	3 ml	1,5 ml	1,5 ml	3 ml	(Stylo jetable)	(Stylo jetable)
B-D [®] PEN ULTRA	B-D [®] PEN ULTRA	OMNICAN [®] PEN 1 OMNICAN [®] PEN 2	AUTOPEN [®] 1 AUTOPEN [®] 2	NOVOPEN [®] 3	NOVOLET [®]	UMULINE [®] PEN HUMALOG [®] PEN



OPTISET



AIGUILLES



Protéger, comment ?

- Pour permettre aux patients diabétiques de faire face à cette contrainte d'élimination des D.A.S.R.I.A., BD a développé une gamme de kits comprenant tous un collecteur gracieusement inclus.
- Nouveau ! BD Micro-Fine™ + Aiguilles Kit Collecteur

- 5 mm (ACL : 444601 7)
- 8 mm (ACL : 444600 0)
- 12.7 mm (ACL : 444599 2)




ACCESSOIRES




TECHNIQUES D'INJECTION

FACTEURS D'INFLUENCE

- **Taille de la goutte au point de dépôt**
- **Température locale (douche)**
- **Activité de la masse musculaire sous jacente**
- **Epaisseur du tissus sous cutané**




ROULER



AGITER lentement





CONTRÔLER




laisser 5-10 secondes l'aiguille sous la peau

PLI CUTANE










SITES D'INJECTION




**Pour une meilleure
reproductibilité,
injecter dans
la même zone,
à la même heure**




L'autosurveillance





Injections 2 fois par jour



● J'adapte la dose de.....
du matin, d'après les résultats
de la matinée et de midi (avant le déjeuner).

● J'adapte la dose de.....
du matin, d'après les résultats
de l'après-midi et du soir.

● J'adapte la dose de.....
du soir, d'après les résultats
du coucher et du début de la nuit.

● J'adapte la dose de.....
du soir, d'après les résultats
de la fin de la nuit et du lendemain matin.

Avec un mélange de 2 insulines (action rapide et action prolongée) :
- je n'augmente pas les deux doses d'insuline en même temps.

Observation

Noter tout événement inhabituel : infection, alimentation, émotion.

Matin

	S*	A*	Glycémie au réveil	Insuline avant le petit déjeuner	Glycémie pendant la matinée	Glycémie avant le déjeuner
Lundi	0	0	1.20	6 H		1.50
Hypoglycémie				16 Nph		
Mardi	0	0	1.50	6 H		1.75
Hypoglycémie				16 Nph		
Mercredi	0	0	1.40	6 H		1.90
Hypoglycémie				16 Nph		
Jeudi	0	0	1.35	H?		
Hypoglycémie				Nph?		
Vendredi						
Hypoglycémie						
Samedi						
Hypoglycémie						
Dimanche						
Hypoglycémie						

Après-midi

Insuline avant le déjeuner	Glycémie de l'après-midi	Glycémie avant le repas du soir
		1.60
		1.80
		1.80

Soir et Nuit

Insuline avant le dîner	Glycémie en soirée	Insuline au coucher	Glycémie de nuit
4 H 8 Nph	1.85		
4 H 8 Nph	2.20		
4 H 8 Nph	2.05		